

ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: درمان سالک

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند به علت کاهش تولید گلوکانتیم در شرکت سازنده (سانوفی فرانسه) و همچنین محدودیت ایجاد شده در انتقال دارو از خارج به داخل کشور، علی‌رغم اینکه از مدت‌ها قبل سفارش خرید گلوکانتیم داده شده و منابع مالی آن نیز تامین گردیده ولی شرکت‌های وارد و تامین کننده دارو قادر به انجام تعهدات خود و تامین گلوکانتیم مورد نیاز کشور نیستند. به منظور پیشگیری از ایجاد اختلال در روند درمان سالک، جلسه کمیته کشوری تشکیل و در خصوص درمان‌های جایگزین تصمیمات لازم اتخاذ گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا زمان تامین مجدد داروی گلوکانتیم مطابق دستورالعمل زیر در خصوص درمان بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی (سالک) اقدام گردد.

- ۱- با توجه به اینکه هرچه ضایعات پوستی کوچکتر باشد به درمان بهتر پاسخ می‌دهد لذا آموزش و اطلاع رسانی کافی به جامعه به ویژه در مناطق اندمیک در خصوص مراجعه به موقع به مراکز بهداشتی درمانی (در مراحل اولیه بروز ضایعات پوستی) جهت تشخیص و درمان سالک انجام شود.
- ۲- در شرایط عدم وجود گلوکانتیم و سدیم استیو گلوکونات جهت درمان سالک ساده و بدون عارضه، با اندازه کوچک و تعداد محدود ضایعات پوستی و در غیر نواحی حساس (صورت، ژنیتالیا، مفاصل و انگشتان) می‌توان از کرایوتراپی به تنهایی استفاده کرد.
- ۳- ژل موضعی سیناآمفولیش مورد تایید سازمان غذا و دارو است و استفاده از آن برای درمان موضعی سالک به همراه یکی از آنتی‌موان‌های پنج ظرفیتی و یا به تنهایی مورد تایید است.
- ۴- از ژل آمفولیش بصورت موضعی جهت درمان ضایعات پوستی سالک در تمامی نواحی بدن به غیر از چشم و پلک می‌توان استفاده کرد.
- ۵- در مواردی که نیاز به انجام درمان سیستمیک نمی‌باشد می‌توان جهت درمان موضعی ضایعات پوستی از ژل موضعی سیناآمفولیش هر ۱۲ ساعت برای مدت ۴ هفته استفاده کرد. (سفارش خرید ژل موضعی سیناآمفولیش داده شده و در آینده نزدیک در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده خواهد شد)
- ۶- در مواردی که درمان سیستمیک اندیکاسیون دارد، در صورت عدم وجود گلوکانتیم یا سدیم استیوگلوکونات می‌توان از میلته فوسین و یا کپسول فلوکونازول استفاده نمود. در بالغین دوز کپسول فلوکونازول ۲۰۰ میلی گرم روزانه و در کودکان ۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای مدت ۶ هفته، به همراه ژل موضعی سیناآمفولیش برای ۴ هفته می‌باشد. در صورت عدم وجود

شماره: ۵۳۰۴/۱۳۵۳۵
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

ندارد

- ژل سیناآمفولیش می‌توان از فلوکونازول به تنهایی استفاده نمود.
- ۷- جهت اخذ مجوز امکان تمدید زمان استفاده از داروی سدیم استیوگلوکونات که به تازگی تاریخ استفاده آن منقضی شده با سازمان غذا و دارو مکاتبه شده است. در صورت صدور مجوز به محض وصول پاسخ مراتب به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
- ۸- برای درمان سیستمیک در بیماران با نقص شدید سیستم ایمنی (نظیر بیماران HIV+ با CD4 کمتر از ۲۰۰) می‌توان از آمفوتریسین B نوع لیپوزومال (AmBisome) استفاده کرد.
- ۹- برای درمان مادران باردار و شیرده مبتلا به سالک با توجه به عوارض درمان‌های سیستمیک و موضعی دارویی صرفاً از کرایوتراپی برای ضایعات پوستی موجود در مناطق غیر حساس و مجاز استفاده شود.
- ۱۰- در صورت احتمال بروز بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی (کالآزار) در منطقه تعداد لازم از گلوکانتیم یا سدیم استیوگلوکونات به منظور درمان آن‌ها نگهداری شود.

دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

