

شماره ۵۳۰۴/۱۳۵۳۵
تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

ندارد

- ژل سیناآمفولیش می توان از فلوکونازول به تنهایی استفاده نمود.
- ۷- جهت اخذ مجوز امکان تمدید زمان استفاده از داروی سدیم استیوگلوکونات که به تازگی تاریخ استفاده آن منقضی شده با سازمان غذا و دارو مکاتبه شده است. در صورت صدور مجوز به محض وصول پاسخ مراتب به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.
- ۸- برای درمان سیستمیک در بیماران با نقص شدید سیستم ایمنی (نظیر بیماران HIV+ با CD4 کمتر از ۲۰۰) می توان از آمفوتریسین B نوع لیپوزومال (AmBisome) استفاده کرد.
- ۹- برای درمان مادران باردار و شیرده مبتلا به سالک با توجه به عوارض درمان های سیستمیک و موضعی دارویی صرفاً از کرایوتراپی برای ضایعات پوستی موجود در مناطق غیر حساس و مجاز استفاده شود.
- ۱۰- در صورت احتمال بروز بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در منطقه تعداد لازم از گلوکانتیم یا سدیم استیوگلوکونات به منظور درمان آن ها نگهداری شود.

دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

