


موضوع:

پریتونیت



تهیه و تنظیم:


واحد آموزشی سلامت

مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا

تابستان ۱۴۰۳

مراقبت بعد از عمل:

- ✓ داروهای تجویز شده در فواصل زمانی معین طبق دستور پزشک استفاده شود.
- ✓ در صورت ارسال نمونه پاتولوژی جواب آن را به رویت پزشک معالج برساند.
- ✓ بیمار در زمان تعیین شده جهت ویزیت و برداشتن بخیه ها به مطب مراجعه کند.
- ✓ در صورت باز شدن بخیه ها، خونریزی، ترشح چرکی از محل عمل، تب بالا و تورم سریعاً به اورژانس یا مطب مراجعه کند.



- ✓ آنتی بیوتیکها و داروها طبق تجویز پزشک برای بیمار ادامه می یابد.
- ✓ بیمار ۶-۸ ساعت بعد از عمل کم کم لبه تخت نشسته و با کمک پرستار از تخت خارج و راه برده شود.
- ✓ رژیم غذایی بیمار بسته به نظر پزشک در صورت نداشتن علایم گوارشی با مایعات شروع می شود.
- ✓ رژیم غذایی بیمار پروتئین، پرکالری، پرویتامین و پرفیبر باشد.
- ✓ بیمار تشویق به فیزیوتراپی تنفسی و سرفه می شود.
- ✓ تعویض پانسمان روزانه زخم انجام شود.
- ✓ محل عمل از نظر خونریزی، هماتوم و قرمزی بررسی شود.
- ✓ بیمار از انجام فعالیت های سنگین تا ۶ هفته پرهیز کند.

پرتیونیت

تعریف: صفاق یا پرتیونیت معمولاً نشان دهنده سوراخ شدن روده است که محتوای روده از جمله باکتری به داخل حفره شکم وارد می شود. این ممکن است در نتیجه آپاندیسیت و کولیت و یا به دلیل التهاب روده باشد که از طریق دیواره روده وارد می شود. پرتیونیت به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است و نیاز به درمان اوژانسی و جراحی دارد.

تشخیص:

- ✓ سی تی اسکن
- ✓ عکسبرداری با اشعه ایکس
- ✓ معاینه توسط پزشک
- ✓ سونوگرافی

علائم:

- ✓ دیسترس تنفسی
- ✓ درد شکم
- ✓ پر بودن شکم
- ✓ سفت شدن شکم
- ✓ تب
- ✓ افزایش ضربان قلب
- ✓ انقباض عضلات شکم در اثر درد
- (علائم با سرفه، خم کردن ران ها و فشار یکدست بر روی شکم و برداشتن ناگهانی آن تشدید می شود).
- ✓ فلج روده (که منجر به تهوع و استفراغ می شود).

عوامل ایجاد کننده ی پرتیونیت

- ✓ پارگی یا سوراخ شدگی هر عضو در داخل شکم نظیر آپاندیس ملتهب یا کیسه صفرای عفونی شده
- ✓ آسیب شکم در اثر چاقو و گلوله
- ✓ بیماری التهابی لگنی
- ✓ پارگی حاملگی

آموزش های قبل از عمل:

- ✓ ناشتا بودن ۸ ساعت قبل از عمل
- ✓ شیو محل عمل قبل از جراحی
- ✓ استحمام شب قبل از عمل
- ✓ درآوردن زیورآلات و دندان مصنوعی و اجسام فلزی
- ✓ تخلیه مثانه قبل از عمل